

**IBUXIM***fem*  
IBUPROFENO 400 mg  
HIOSCINA 20 mg



Comprimidos recubiertos 400 mg/20 mg

## **VENTA LIBRE**

### **Fórmula:**

Comprimidos recubiertos 400 mg/20 mg

Cada comprimido recubierto contiene:

Ibuprofeno.....400 mg

Hioscina N-butilbromuro.....20 mg

Excipientes: celulosa microcristalina; lactosa; croscarmelosa sódica; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; hidroxipropilmetilcelulosa; dióxido de titanio; talco; polietilenglicol; laca aluminica eritrosina; laca aluminica azul brillante.

### **Acción terapéutica:**

Analgésico. Antiespasmódico. Antipirético. Antiinflamatorio.

### **Indicaciones:**

Ibuprofeno+hioscina está indicado para el alivio temporario del malestar por espasmo del tubo digestivo, vía biliar y aparato genitourinario asociado a dolor, como por ejemplo el dolor menstrual.

### **Cómo usar este medicamento:**

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido recubierto cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 1200 mg/día de ibuprofeno (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte a su médico.

### **Contraindicaciones:**

Alergia al ibuprofeno, hioscina, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal. Miastenia gravis (enfermedad de los músculos). Megacolon (enfermedad del intestino grueso).

### **Advertencias y precauciones:**

**Si los síntomas (dolor menstrual) persisten por más de 48 - 72 horas o empeoran, consulte a su médico.**

-Si los síntomas continúan o si el área dolorida esta roja o hinchada, deberá consultar a su médico.

-Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebidas alcohólicas consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

-Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

-La ingesta del ibuprofeno u hioscina puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

-Consulte a su médico antes de tomar ibuprofeno u hioscina si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

-Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

### **Reacciones adversas:**

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

Por su contenido de hioscina puede ocasionalmente producir visión borrosa, sequedad de boca, reducción de la sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia) y potencialmente retención urinaria.

### **Interacciones con otros medicamentos:**

Si usted se encuentra tomando medicamentos para: Sistema Nervioso Central (antidepresivos tricíclicos, difenilhidantoína, litio, amantadina, metoclopramida); asma (agonistas beta adrenérgicos); cardiovasculares (quinidina); antialérgicos (antihistamínicos) deberá consultar a su médico antes de usar este medicamento.

No tomar este medicamento junto con analgésicos o antiinflamatorios, excepto bajo indicación médica.

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

### **Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

**Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**

**Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**Tel.: (011) 4961 8447**

### **Conservación:**

Mantener a una temperatura entre 15°C y 30°C, lejos del calor y la luz solar directa.

### **Presentación:**

Comprimidos recubiertos 400 mg/20 mg: envases conteniendo 6 comprimidos recubiertos.


**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

1000479

Emisión: 05/08

Revisión: 05/08



Elaborado por **SAVANT PHARM S.A.**

Ruta Nacional N° 19, Km 204

Córdoba – CP. X2432XAB

Director Técnico: Mauro G. Bono, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 54488

Industria Argentina