

IBUXIM

ibuprofeno 2%

niños

Venta libre

Fórmula:

Cada 100 ml de suspensión contiene:

Ibuprofeno..... 2 g

Excipientes: polisorbato 80; benzoato de sodio; ciclamato de sodio; sacarina sódica; goma xántica; sorbitol; ácido cítrico anhidro; glicerina; sacarosa; colorante FD&C red N° 40; esencia de frutilla; esencia de cereza; agua purificada c.s.p. 100 ml.

Acción terapéutica: Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio.

Uso del medicamento: Lea detenidamente esta información.

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

Cómo usar este medicamento: Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

Edad (años)	Peso (Kilos)	Dosis (ml)
2 a 3	11 a 15	5 ml (1 cda. de té)
4 a 5	16 a 21	7,5 ml (1 ½ cda. de té)
6 a 8	21 a 27	10 ml (2 cdtas. de té)
9 a 10	27 a 32	12,5 ml (2 y ½ cdtas. de té)
Más de 10	Más de 32	15 ml (3 cdtas. de té)

Menos de 2 años / 11 kg consulte a su médico.

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

Precauciones: Consulte con su médico en estos casos si: - El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento o el dolor y/o la fiebre empeoran.

- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte con su médico. Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Advertencias: Salvo indicación médica:

No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.

No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

No utilizar contra el dolor de estómago.

Reacciones Adversas: En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

Sobredosis: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648 / 4658 7777

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447

Conservación: Mantener a una temperatura entre 15°C y 30°C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación: Envases conteniendo 1 frasco x 90 ml.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**



Elaborado por SAVANT PHARM S.A.

Ruta Nacional N° 19, Km 204

Córdoba - CP. X2432XAB

Director Técnico: Cristian Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 52103

Industria Argentina