

IBUXIM
rápida acción
ibuprofeno 400 mg



Cápsulas de gelatina blanda

Analgésico, Antiinflamatorio y Antifebril

Cápsulas de gelatina blanda 400 mg

VENTA LIBRE

Fórmula:

Cápsulas de gelatina blanda 400 mg

Cada cápsula de gelatina blanda contiene: Ibuprofeno.....400 mg

Excipientes: polietilenglicol 400; glicerina bi-destilada; hidróxido de potasio; polivinilpirrolidona k 30; agua purificada; Gelatina tipo 23: gelatina de cerdo 200 bloom; glicerina bi-destilada; agua purificada; metilparabeno; propilparabeno; sorbitol polyol; colorante amarillo ocaso F.C.F. CI 15985; colorante rojo allura CI 16035.

Acción terapéutica:

Analgésico, antipirético, antiinflamatorio.

Uso del medicamento. Lea detenidamente esta información:

Está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

Cómo usar este medicamento:

Adultos y mayores de 15 años: 1 cápsula de gelatina blanda cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 1200 mg/día (3 cápsulas de gelatina blanda de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte a su médico.

Contraindicaciones:

Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

Advertencias y Precauciones:

-No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.

-Si los síntomas continúan o si el área dolorida esta roja o hinchada, deberá consultar a su médico.

-Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebidas alcohólicas consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

-Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

-La ingesta del ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

-Consulte a su médico antes de tomar ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

Reacciones adversas:

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

Interacciones con otros medicamentos:

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

Sobredosis:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447

Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15°C y 30°C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación:

Cápsulas de gelatina blanda: envases conteniendo 10 y 20 cápsulas de gelatina blanda.


MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

1000784

Emisión: 06/08

Revisión: 06/08



Elaborado por COLBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Fraccionado por **SAVANT PHARM S.A.**

Ruta Nacional N° 19, Km 204

Córdoba - CP. X2432XAB

Director Técnico: Mauro G. Bono, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 54577

Industria Argentina