



Lyncis

+ Antiácido
Reductor de Ácidos

Venta libre

Fórmula:

Comprimidos masticables 10 mg/800 mg/165 mg

Cada comprimido masticable contiene:

Famotidina10 mg

Carbonato de calcio800 mg

Hidróxido de magnesio165 mg

Excipientes: estearato de magnesio; sorbitol; celulosa microcristalina; acesulfameK; manitol; sucralosa; polivinilpirrolidona; insta coat mask, gránulos de menta; esencia de menta; esencia de limón.

Uso del medicamento:

Lea detenidamente esta información.

LYNCIS es un antiácido indicado para el alivio de la acidez estomacal asociada con la indigestión ácida y ardor estomacal.

LYNCIS posee una doble acción en un solo comprimido masticable: ANTIÁCIDO, mediante el carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio, que neutraliza rápidamente la acidez y REDUCTOR DE LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO mediante la famotidina, efecto que dura aproximadamente 12 horas.

Cómo usar LYNCIS:

Adultos y niños mayores de 12 años:

-Masticar completamente 1 comprimido y luego ingerirlo.

-No ingiera más de 2 comprimidos masticables en 24 horas.

Modo de administración:

Los comprimidos masticables se ingieren después de ser masticados.

Contraindicaciones:

No consuma LYNCIS si presenta alergia a algunos de los componentes del producto, particularmente a la famotidina o a otros reductores de ácido.

No utilizar LYNCIS si tiene dificultades al tragar sólidos o líquidos.

No utilizar LYNCIS con otros productos que tengan famotidina o compuestos reductores de ácido.

Advertencias y precauciones:

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Ante cualquier duda consulte a su médico. LYNCIS contiene calcio.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar LYNCIS si está tomando alguna medicina de venta bajo receta. Los antiácidos pueden interactuar con ciertas medicinas de venta bajo receta médica.

Si usted tiene dudas acerca de estas instrucciones consulte con su farmacéutico o un profesional médico.

Efectos adversos posibles:

Generalmente el producto es bien tolerado y cuando se presentan reacciones adversas las mismas son de carácter leve y de naturaleza reversible.

Se han descripto los siguientes efectos adversos, que pueden tener relación de causalidad con famotidina, en más de 1% de los pacientes tratados: dolor de cabeza (4,7%), diarrea (1,7%), mareo (1,35%) y constipación (1,2%)

Raramente e han reportados otros efectos posibles, incluso serios, generales y a nivel de distintos órganos, incluyendo reacciones alérgicas. Consulte a su médico acerca de cualquier síntoma que le impresione relacionado con el uso del producto, que le ocasione preocupación o que le parezca poco usual.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648 / 4658 7777

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447

Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15°C y 30°C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación:

Comprimidos masticables 10 mg/800 mg/165 mg: envases conteniendo 10 comprimidos masticables.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Elaborado por **SAVANT PHARM S.A.**

Ruta Nacional N° 19, Km 204

Córdoba - CP. X2432XAB

Director Técnico: Cristian Dal Poggetto,

Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 54129

Industria Argentina

 www.lyncis.com.ar

 **0810-444-32267**