


Repliderm

Terbinafina 1%



Crema 1 g - Uso Externo
Venta libre

Fórmula:

Cada 100 g de crema contiene:

Terbinafina (como clorhidrato)..... 1 g

Excipientes: alcohol cetosterilico; cetomacrogol 1000; vaselina líquida; vaselina sólida; alcohol bencílico; hidróxido de sodio; agua purificada c.s.p. 100 g.

Acción Terapéutica:

Antimicótico.

Uso del medicamento:

Lea detenidamente esta información.

REPLIDERM está indicada para el tratamiento del "pie de atleta" (tinea pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles (tiña crural), manos, tórax y axilas.

Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despellejamiento, salpullido y ulceración.

Cómo se usa este medicamento:

Adultos y niños mayores de 12 años: antes de aplicar REPLIDERM, deberá lavar el área afectada con agua y jabón. Luego seque cuidadosamente.

Aplicar una o dos veces por día en la zona circundante.

Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior este seco.

Lave las manos después de cada uso.

La duración del tratamiento, siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido, es de una semana.

Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, consulte a su médico.

Advertencias y precauciones:

Sólo para uso externo.

Contraindicaciones:

-Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

-Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

-No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales.

-Embarazo y lactancia, sólo bajo expresa prescripción médica.

Efectos adversos:

Las formulaciones tópicas de terbinafina son bien toleradas. En los estudios clínicos realizados, solo se detectaron reacciones adversas, posiblemente asociadas a la terbinafina, en el 2% de los casos. Los casos más frecuentes fueron irritación y urticaria, efectos secundarios que se presentaron en un 1%.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447


Conservación:

Mantener a una temperatura menor a 30° C.

Presentación:

Crema 1 g: envases conteniendo 1 pomo con 15 g.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**



Elaborado por **SAVANT PHARM S.A.**

Ruta Nacional Nº 19, Km. 204

Córdoba - CP. X2432XAB

Director Técnico: Cristian Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado Nº 54463

Industria Argentina